



## Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati nelle ambulanze o mezzi di trasporto

DESTINATARI DELL'INDICAZIONE (personale/pazienti)	TIPO DI ATTIVITÀ	DPI DA INDOSSARE O MISURE DI PROTEZIONE
<b>Operatori sanitari</b>	Trasporto di un paziente sospetto per COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mascherina chirurgica, FFP2 se rischio aumentato per intensità e durata o nel caso di ambulanza con rianimatore</li> <li>Camice/grembiule monouso/tuta</li> <li>Guanti</li> <li>Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera</li> </ul>
<b>Autisti</b>	Solo guida del mezzo con COVID-19 sospetto o confermato <b>CON</b> separazione fra la cabina di guida e l'ambiente in cui staziona il paziente <b>SENZA</b> ricircolo dell'aria tra i due compartimenti	Mantenere la distanza di almeno un metro dal paziente. Non sono necessari DPI
	Addetti solo alla guida di un mezzo che <b>NON</b> presenta una separazione fra la cabina di guida e l'ambiente in cui staziona il paziente sospetto per COVID-19	Mascherina chirurgica
	Accesso nella stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mascherina chirurgica</li> <li>Camice/grembiule monouso</li> <li>Guanti</li> <li>Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera</li> </ul>
<b>Paziente sospetto per COVID-19</b>	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento	Fornire al paziente mascherina chirurgica, se tollerata
<b>Addetti alla pulizia delle autoambulanze</b>	Pulizie dopo e fra un trasporto e l'altro di un paziente sospetto per COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento (alla fine del trasporto del paziente, nel caso in cui sia possibile aerare il mezzo, utilizzare la mascherina chirurgica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mascherina chirurgica</li> <li>Camice/grembiule monouso</li> <li>Guanti spessi</li> <li>Occhiali di protezione (se c'è rischio di schizzi di materiale organico o di sostanze chimiche)</li> <li>Stivali o scarpe da lavoro chiuse</li> </ul>

Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l'igiene delle mani e l'**etichetta respiratoria**. I DPI vanno smaltiti dopo l'utilizzo in appropriati contenitori. L'igiene delle mani va praticata PRIMA e DOPO l'utilizzo dei DPI. L'ambulanza utilizzata per il trasferimento di casi sospetti per COVID-19 deve essere decontaminata immediatamente dopo il trasferimento.

**L'etichetta respiratoria consiste in:** 1) coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la piega del gomito; 2) eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 3) praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).



Testo tratto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. OZ00034 del 18/04/2020. Per maggiori informazioni: [salutelazio.it](http://salutelazio.it) - [regione.lazio.it](http://regione.lazio.it)