



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati nell'assistenza ambulatoriale

DESTINATARI DELL'INDICAZIONE (personale/pazienti)	TIPO DI ATTIVITÀ	DPI DA INDOSSARE O MISURE DI PROTEZIONE
IN AMBULATORIO		
Operatori sanitari 1)	Esame obiettivo di pazienti CON sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica (FFP2 in specifici contesti assistenziali) 2) Camice/grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Esame obiettivo di pazienti SENZA sintomi respiratori	DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione a maggiore rischio
Pazienti CON sintomi respiratori	Qualsiasi	Fornire al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata
Pazienti SENZA sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica
Addetti alle pulizie	Dopo la visita di pazienti CON sintomi respiratori aerare gli ambienti prima di un nuovo ingresso	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice/grembiule monouso Guanti spessi Occhiali di protezione (se c'è rischio di schizzi di materiale organico o di sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse
NELLE SALE D'ATTESA		
Pazienti CON sintomi respiratori	Qualsiasi	Fornire al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata. Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri pazienti. Se questo non è possibile, assicurare la distanza di almeno un metro dagli altri pazienti
Pazienti SENZA sintomi respiratori	Qualsiasi	Indossare la mascherina chirurgica Mantenere la distanza di almeno un metro
AREE AMMINISTRATIVE		
Tutti gli operatori, sanitari e non	Attività amministrative	Indossare sempre la mascherina
AREA ACCETTAZIONE UTENTI		
Operatori sanitari 1)	Screening preliminare che non comporti contatto diretto 3)	Indossare sempre la mascherina. Mantenere la distanza di almeno un metro dal paziente
Pazienti CON sintomi respiratori	Qualsiasi	Mantenere la distanza di almeno un metro dal paziente. Fornire al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata
Pazienti SENZA sintomi respiratori	Qualsiasi	Indossare sempre la mascherina
Accompagnatori	Accesso nella stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta	Indossare sempre la mascherina

Etichetta respiratoria

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d'altro, la piega del gomito;
- eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
- praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

I DPI vanno smaltiti dopo l'utilizzo in appropriati contenitori. L'igiene delle mani va praticata PRIMA e DOPO l'utilizzo dei DPI.

Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria →

1) Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici - 2) In contesti assistenziali sul territorio ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19, può essere preso in considerazione il ricorso a FFP2, in base a una appropriata valutazione del rischio lavorativo che tenga anche conto del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente - 3) Queste attività comprendono, ad esempio, l'utilizzo di termometri senza contatto, termo camere e il tempo di osservazione e intervista: in tutti i casi bisogna comunque rispettare la distanza di almeno un metro dal paziente

Riferimenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. - Ordinanza del Presidente N. 34 del 18 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020

