



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati nelle strutture sanitarie e aree di degenza¹

DESTINATARI DELL'INDICAZIONE (personale/pazienti)	TIPO DI ATTIVITÀ	DPI DA INDOSSARE O MISURE DI PROTEZIONE
STANZE DI DEGENZA²		
Operatori sanitari³	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica o FFP2 in specifici contesti assistenziali⁴ Camice/grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Procedure o setting a rischio di generazione di aerosol ⁵	<ul style="list-style-type: none"> FFP2 o FFP3 Camice/grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Esecuzione di tampone oro- e rinofaringeo (stessi DPI anche per tamponi effettuati in comunità)	<ul style="list-style-type: none"> FFP2 o FFP3 o mascherina chirurgica se non disponibile Camice/grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
Addetti alle pulizie³	Accesso a stanze di degenza con pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice/grembiule monouso Guanti spessi Occhiali di protezione (se c'è rischio di schizzi di materiale organico o di sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse
Visitori (necessario limitare l'accesso)⁶	Accesso a stanze di degenza con pazienti COVID-19 qualora eccezionalmente permesso	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice monouso Guanti Evitare contatti, strette di mano, abbracci
Operatori non sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice/grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

1) Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria. I DPI vanno smaltiti dopo l'utilizzo in appropriati contenitori. L'igiene delle mani va praticata PRIMA e DOPO l'utilizzo dei DPI. 2) Nelle Terapie Intensive l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare sempre FFP2/FFP3 o sistemi equivalenti. 3) Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici. 4) In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile, ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio lavorativo che tenga conto anche del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. 5) Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo. 6) I visitatori al momento della redazione di questo documento non sono consentiti in base alla circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare PRIMA di indossare e DOPO aver rimosso i DPI; questo dovrebbe essere supervisionato da un operatore sanitario.



Riferimenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. - Ordinanza del Presidente N. 34 del 18 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati nelle strutture sanitarie e aree di degenza¹

DESTINATARI DELL'INDICAZIONE (personale/pazienti)	TIPO DI ATTIVITÀ	DPI DA INDOSSARE O MISURE DI PROTEZIONE
AREE DI TRANSITO DEI PAZIENTI (AD ES. REPARTI, CORRIDOI)		
Tutti gli operatori, sanitari e non	Qualsiasi attività che NON comporta un contatto con pazienti COVID-19	Indossare mascherina chirurgica e guanti monouso solo per trasporti prolungati (superiori a 15 minuti)
AREE DI DEGENZA SENZA PAZIENTI COVID-19 ACCERTATI O SOSPETTI, INCLUSE UNITÀ DI LUNGODEGENZA, DAY HOSPITAL, DAY SERVICES		
Operatori sanitari	Contatto diretto con pazienti non sospetti COVID-19	DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria attività.
TRIAGE (IN AMBITO OSPEDALIERO PER ACCETTAZIONE UTENTI)		
Operatori sanitari²	Screening preliminare che NON comporta contatto diretto ⁴	Vetrata, interfono/citofono. In alternativa mantenere la distanza di almeno un metro dal paziente se possibile o indossare mascherina chirurgica
	Screening CON contatto diretto con paziente COVID-19 positivo o sospetto	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice/grembiule monouso Guanti monouso Occhiali di protezione/visiera
Pazienti CON sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere la distanza di almeno un metro dall'operatore (in assenza di vetrata/interfono/ citofono) Fornire al paziente mascherina chirurgica, se tollerata Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata ventilazione se possibile. In alternativa collocazione in un'area separata mantenendo sempre la distanza di un metro da altre persone
Pazienti SENZA sintomi respiratori	Qualsiasi	Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e indossare sempre la mascherina
LABORATORIO		
Tecnici di laboratorio²	Manipolazione di campioni respiratori	Procedure e DPI adeguati in relazione al livello di biosicurezza BSL classe 2 (diagnostica con tecniche di biologia molecolare) o 3 (coltura e isolamento del virus)
AREE AMMINISTRATIVE		
Tutti gli operatori, sanitari e non	Attività amministrative che NON comportano contatto con pazienti COVID-19	Mantenere la distanza di almeno un metro dagli utenti e indossare la mascherina.

¹) Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria. I DPI vanno smaltiti dopo l'utilizzo in appropriati contenitori. L'igiene delle mani va praticata PRIMA e DOPO l'utilizzo dei DPI. ²) Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici. ³) In alcuni ambiti assistenziali sanitari, si valuti la possibilità di uso della mascherina chirurgica come presidio utilizzare all'interno dell'ospedale tout court per tutti i sanitari al fine di ridurre la trasmissione da eventuali operatori sanitari infetti. ⁴) Queste attività comprendono, ad esempio, l'utilizzo di termometri senza contatto, termo camere e il tempo di osservazione e intervista: in tutti i casi bisogna comunque rispettare la distanza di almeno un metro dal paziente.

