

ALLEGATO 2- C

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

PROGRAMMI DI SCREENING DEL TUMORE DEL COLON-RETTO ANNI 2017-2019

ASL	N° SOGGETTI INVITATI			N° SOGGETTI RISPONDENTI			ESTENSIONE INVITI (%)			ADESIONE (%)			COPERTURA (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
RM 1	172.726	163.586	171.472	28.974	33.887	42.096	98	92	97	17,5	21,6	25,1	17,3	19,9	24,5
RM 2	217.290	212.039	195.246	51.566	52.329	50.439	104	99	91	24,4	25,5	26,4	25,5	25,4	24,3
RM 3	100.273	97.562	92.114	28.434	24.449	24.285	103	99	93	29,3	25,7	26,5	30,6	25,7	25,2
RM 4	46.146	56.765	49.266	11.240	13.113	12.070	88	108	91	24,8	23,1	24,6	22,1	25,1	22,5
RM 5	72.707	75.206	86.664	20.079	19.485	20.391	95	96	100	27,6	25,9	23,5	26,3	25,0	25,9
RM 6	66.186	88.745	74.610	27.185	33.477	27.305	71	97	81	43,7	38,4	36,9	31,1	37,6	30,1
VITERBO	55.631	49.693	54.455	19.893	16.364	14.713	98	89	99	38,2	33,9	27,2	37,9	30,8	27,3
RIETI	15.092	18.921	25.346	4.068	1.690	8.431	57	70	93	27,0	9,0	33,3	15,4	6,3	31,3
LATINA	89.500	92.390	80.193	26.561	33.387	25.586	93	98	86	31,8	37,5	32,2	30,2	37,0	28,0
FROSINONE	50.712	45.773	56.428	15.086	13.449	14.001	61	55	67	30,8	30,3	25,4	19,0	16,8	17,2
LAZIO	886.263	900.680	885.794	233.086	241.630	239.317	84	92	91	27,3	27,6	27,4	25,2	25,7	25,1

ASL	tasso di positività FOBT (%)			COMPLIANCE ALLA COLONSCOPIA (%)			DETECTION RATE (‰)					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	carcinomi			adenomi avanzati		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019
RM 1	4,9	4,9	4,7	80,7	87,4	90,6	2,0	1,4	1,3	9,5	7,8	7,5
RM 2	5,8	5,9	6,4	88,3	95,2	90,6	1,9	1,8	1,3	10,9	9,8	8,9
RM 3	6,3	5,6	6,0	91,7	99,3	98,1	2,1	1,7	1,5	14,2	12,2	9,0
RM 4	5,3	6,1	6,8	89,3	66,7	76,3	1,8	0,7	1,3	12,5	1,6	6,5
RM 5	6,6	5,6	5,2	79,7	95,7	96,0	6,7	4,2	2,4	8,8	8,2	8,0
RM 6	5,5	4,7	5,3	88,4	92,1	87,8	1,8	1,8	1,4	11,0	8,9	9,9
VITERBO	5,1	4,9	6,0	74,0	95,3	92,8	1,3	1,6	1,8	11,5	13,2	17,2
RIETI	5,7	4,9	5,4	96,6	96,7	93,4	1,2	0,0	1,7	16,2	8,8	9,8
LATINA	5,2	5,5	4,8	90,2	82,9	91,7	1,7	1,3	0,9	11,4	8,9	8,0
FROSINONE	6,4	5,8	5,5	88,8	98,0	84,8	2,4	2,7	1,7	16,2	14,9	10,7
LAZIO	6,1	5,4	5,6	86,4	91,0	90,7	2,6	1,8	1,4	13,8	9,4	9,1

Le ASL Frosinone e Rieti hanno attivato lo screening nel 2015

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

FONTE SIPSOWeb

ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, VT, RI, LT, FR.

LEGENDA

estensione inviti

adesione

COPERTURA

tasso di invio al II livello
(mammografico
cervice uterina)

tasso di positività al
SOF
(colon-retto)

tasso di adesione
alla Colonscopia
(colon-retto)

tasso di
identificazione
diagnostica
(Detection Rate %)

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: >90%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):

Mammografico

valore standard accettabile: >50%

Cervice Uterina

valore standard accettabile: >40%

Colon-retto

valore standard accettabile: > 45%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)

Mammografico

valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%

Cervice Uterina (1). La copertura è corretta per il numero di test HPV secondo la formula: (pap test + (HPV test * 1,666))/ Pop target

valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

Colon-retto

valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:

Mammografico

valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3% esami successivi

valore standard accettabile: < 7% primi esami, < 5% esami successivi

Cervice Uterina

nessun valore di riferimento

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:

valore standard desiderabile: < 5% primi esami, < 3,5% esami successivi

valore standard accettabile: < 6% primi esami, < 4,5% esami successivi

% di soggetti aderenti alla colonscopia sul totale dei soggetti inviati al secondo livello:

valore standard desiderabile: >90%

valore standard accettabile: >85 %

Mammografico

Rapporto del numero di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening

nessun valore di riferimento

Cervice Uterina

Rapporto del numero di donne con lesioni di alto grado (CIN2+) e il numero di donne sottoposte a screening

nessun valore di riferimento

Colon-retto

Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening

DR CA: valore standard desiderabile: >2,5 ‰ primi esami, > 1,5 ‰ esami successivi

DR AA: valore standard desiderabile: >10 ‰ primi esami, > 7,5 ‰ esami successivi