

ALLEGATO 2 - B

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

PROGRAMMI DI SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA

ANNI 2017-2019

ASL	N° DONNE INVITATE			N° DONNE RISPONDENTI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
RM 1	87.718	99.468	72.447	18.069	25.107	20.488
RM 2	134.270	130.447	119.785	31.261	30.930	26.349
RM 3	56.492	62.635	58.470	15.410	15.891	14.414
RM 4	21.923	18.321	19.447	7.275	5.235	5.179
RM 5	27.675	39.384	35.852	7.085	10.963	9.953
RM 6	47.682	55.892	51.190	11.175	14.136	11.321
VITERBO	34.204	28.410	26.238	11.701	11.291	11.301
RIETI	11.040	10.746	10.509	4.051	2.609	2.642
LATINA	28.920	45.339	38.720	11.335	14.144	14.108
FROSINONE	55.557	52.082	26.353	15.797	14.651	9.017
LAZIO	505.481	542.724	459.011	133.159	144.957	124.772

ASL	ESTENSIONE INVITI (%)			ADESIONE (%)			COPERTURA (%)			TASSO INVIO AL II LIVELLO (%)			DETECTION RATE (‰)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
RM 1	87	93	100	21,9	26,8	29,0	26,5	37,9	33,1	3,3	2,0	2,3	4,2	6,0	7,3
RM 2	100	100	92	24,9	24,9	23,4	25,1	25,1	28,0	3,0	3,0	3,8	4,5	3,7	4,6
RM 3	98	100	100	28,9	26,3	25,0	26,7	28,5	27,1	4,5	4,7	3,4	4,3	3,9	3,2
RM 4	109	90	96	36,6	29,8	27,7	37,7	26,7	26,7	4,6	2,0	2,5	2,7	3,1	2,7
RM 5	91	97	100	25,9	28,0	28,0	25,0	37,8	33,5	9,8	1,8	2,2	5,6	2,0	1,4
RM 6	88	100	93	26,0	26,1	22,5	33,5	40,8	34,1	2,9	1,7	1,9	2,1	2,1	2,3
VITERBO	116	93	85	38,1	42,2	46,5	39,6	38,8	52,3	2,2	2,9	5,3	3,0	3,9	2,7
RIETI	100	100	100	37,0	24,4	25,4	46,0	29,5	31,4	3,9	2,6	1,9	5,9	4,2	3,0
LATINA	85	100	100	43,8	34,7	39,9	34,4	42,8	42,9	4,2	1,5	2,1	1,1	1,2	1,6
FROSINONE	100	100	57	30,6	30,3	35,8	34,7	37,9	28,3	3,2	3,4	5,3	4,8	8,4	6,7
LAZIO	82	100	95	27,7	28,3	28,3	28,1	34,1	32,7	2,6	3,4	3,2	3,2	4,1	3,9

Dal 2019 le ASL RM1, RM4, RM 5, RM 6, RI e LT effettuano il Test HPV-DNA come test primario nelle donne 30-64

Dal 2019 le ASL RM2, RM3, VT effettuano il Test HPV-DNA come test primario nelle donne 50-64

Dal 2019 la ASL FR effettua il Test HPV-DNA come test primario nelle donne 40-64



ALLEGATO 2

FONTE SIPSOWeb

LEGENDA

estensione inviti

adesione

COPERTURA

tasso di invio al II livello
(mammografico
cervice uterina)

tasso di positività al SOF
(colon-retto)

tasso di adesione alla
Colonscopia
(colon-retto)

tasso di identificazione
diagnostica
(Detection Rate ‰)

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI SCREENING: PRINCIPALI INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO

ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, VT, RI, LT, FR.

% di soggetti coinvolti rispetto alla popolazione target (corretta per inviti inesitati):
valore standard: >90%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto ai soggetti coinvolti (corretta per esclusi):

Mammografico
valore standard accettabile: >50%

Cervice Uterina
valore standard accettabile: >40%

Colon-retto
valore standard accettabile: > 45%

% di soggetti rispondenti al test di screening rispetto alla popolazione target (corretta per esclusi prima dell'invito)

Mammografico
valore standard accettabile: >=35%; - valore standard desiderabile: >=59%

Cervice Uterina (1). La copertura è corretta per il numero di test HPV secondo la formula: (pap test + (HPV test * 1,666)) / Pop target
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

Colon-retto
valore standard accettabile: >=25%; - valore standard desiderabile: >=49%

% di donne inviate all'approfondimento diagnostico rispetto alle donne che hanno eseguito il test di I livello:

Mammografico
valore standard desiderabile: < 5% **primi esami**, < 3% **esami successivi**
valore standard accettabile: < 7% **primi esami**, < 5% **esami successivi**

Cervice Uterina
nessun valore di riferimento

% di soggetti positivi al test del sangue occulto fecale sul totale dei soggetti screenati:
valore standard desiderabile: < 5% **primi esami**, < 3,5% **esami successivi**
valore standard accettabile: < 6% **primi esami**, < 4,5% **esami successivi**

% di soggetti aderenti alla colonscopia sul totale dei soggetti inviati al secondo livello:
valore standard desiderabile: >90%
valore standard accettabile: >85 %

Mammografico
Rapporto del numero di donne con cancro identificato allo screening e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Cervice Uterina
Rapporto del numero di donne con lesioni di alto grado (CIN2+) e il numero di donne sottoposte a screening
nessun valore di riferimento

Colon-retto
Rapporto del numero di soggetti con diagnosi di carcinoma (CA) o adenoma avanzato (AA) e il numero di persone sottoposte a screening

DR CA: valore standard desiderabile: >2,5 ‰ **primi esami**, > 1,5 ‰ **esami successivi**

DR AA: valore standard desiderabile: >10 ‰ **primi esami**, > 7,5 ‰ **esami successivi**