



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

Ai Direttori generali e
Commissari straordinari di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- ex Classificati

Oggetto: farmaco luspatercept (REBLOZYL® - BMS) – SC - sindrome mielodisplastica - nuova indicazione

Con Determina PRES. AIFA n. 1541 del 11.11.2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21.11.2025, è stata autorizzata l'erogazione a carico del SSN del medicinale Reblozyl 25 e 75 mg - polvere per soluzione iniettabile SC 1 flaconcino (AIC n. 048905018/E e n. 048905020/E – classe A-PHT) per la nuova indicazione terapeutica:

- Reblozyl è indicato negli adulti per il trattamento dell'anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (*myelodysplastic syndromes*, MDS) a rischio molto basso, basso e intermedio.

Il farmaco Reblozyl, per l'indicazione soprariportata, è soggetto a prescrizione tramite Piano Terapeutico web-based AIFA degli specialisti oncologi, ematologi e internisti afferenti ai Centri di seguito riportati:

1. Az. Osp. San Giovanni-Addolorata
2. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
3. Az. Osp. Sant'Andrea
4. Az. Osp. Univ. Pol. Tor Vergata
5. Policlinico Umberto I
6. Policlinico A. Gemelli
7. Policlinico Campus Biomedico
8. IRCCS IFO – Regina Elena
9. ASL Roma 1 – Polo Ospedaliero
10. Osp. Gemelli Isola
11. Osp. S. Pietro - FBF
12. ASL Roma 2 – Polo Ospedaliero
13. ASL Roma 3 – Osp. G.B. Grassi
14. ASL Roma 4 – Osp. San Paolo – Civitavecchia
15. ASL Roma 5 – Polo Ospedaliero
16. ASL Roma 6 – Polo Ospedaliero
17. ASL Latina – Polo Ospedaliero
18. ASL Frosinone – Polo Ospedaliero
19. ASL Rieti – Osp. San Camillo de Lellis
20. ASL Viterbo – Osp. Santa Rosa (ex Belcolle)

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle malattie ematologiche.



**REGIONE
LAZIO**

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21**

L'erogazione del farmaco è a carico del Centro Prescrittore.

L'utilizzo del farmaco Reblozyl, per l'indicazione soprariportata, presso tutte le strutture private accreditate sopracitate, sarà subordinato all'acquisto da parte della ASL capofila RM2 ai sensi del DCA70, non appena verranno espletate le procedure di acquisto.

La Dirigente dell'Area
Marzia Mensurati

Il Direttore
Andrea Urbani

2026.02.05DB