

Nota Importante a tutti i prescrittori di Enoxaparina

Punti di forza, debolezze, opportunità e rischi nell'utilizzo dell'enoxaparina

Nell'ambito dell'attività di revisione dell'appropriatezza prescrittiva, la CoReFa sottolinea la necessità di monitorare l'utilizzo di enoxaparina. L'enoxaparina nella regione Lazio presenta un valore in termini di spesa pro capite superiore del 122,1% rispetto al valore medio nazionale (1). Per questo motivo sono stati riassunti i punti di forza, le debolezze, le opportunità e i rischi legati all'uso di enoxaparina.

PUNTI DI FORZA

L'enoxaparina è un'eparina a basso peso molecolare indicata per prevenire e trattare la formazione di trombi in alcune patologie e condizioni:

- profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti chirurgici e in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta e mobilità ridotta;
- trombosi venosa profonda e embolia polmonare;
- angina instabile e infarto del miocardio;
- durante il processo di emodialisi.

L'enoxaparina è presente in diversi dosaggi; il dosaggio corretto da prescrivere ai pazienti varia in base alle diverse condizioni cliniche.

DEBOLEZZE

- L'enoxaparina non può essere utilizzata in modo intercambiabile con altre eparine a basso peso molecolare in quanto presentano diverse caratteristiche di fabbricazione, efficacia clinica e dosaggio.
- L'enoxaparina deve essere somministrata mediante iniezione ad orari ben definiti, determinando difficoltà nei pazienti non autosufficienti o non adeguatamente assistiti.
- Se il paziente non rispetta i tempi di somministrazione della terapia possono verificarsi gravi complicanze quali emorragia in caso di sovradosaggio.

OPPORTUNITÀ

- L'enoxaparina presenta in commercio dei farmaci biosimilari. Questo permette la possibilità di prescrivere farmaci più sostenibili per l'SSN ma con profilo di qualità, efficacia e sicurezza sovrapponibile al farmaco originator.
- L'enoxaparina è presente in commercio sotto forma di siringhe preriempite, già pronte all'utilizzo. Questo facilita il corretto utilizzo del farmaco da parte del paziente.
- L'enoxaparina presenta un'ottima biodisponibilità.
- Per alcune indicazioni *off-label* (come la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio), l'enoxaparina può essere prescritta dai medici specialisti beneficiando della legge 648/96 (2).

RISCHI

- L'uso di enoxaparina è controindicato in concomitanza all'utilizzo di FANS.
- L'uso di enoxaparina è controindicato in pazienti con anamnesi positiva per trombocitopenia immunomediata indotta da eparina negli ultimi 100 giorni o in presenza di anticorpi circolanti.
- È necessario misurare la conta piastrinica prima dell'inizio della terapia e regolarmente durante il trattamento con enoxaparina per evitare il rischio di trombocitopenia immunomediata.
- Non bisogna eseguire anestesia spinale/epidurale o una puntura lombare nelle 24 ore che seguono la somministrazione di enoxaparina per i potenziali rischi di sanguinamento.

Si ricorda che la terapia di prevenzione di tromboembolismo venoso con enoxaparina 4.000 UI non può superare i 10- 30 giorni quando prescritta dal medico di medicina generale. La profilassi di tromboembolismo venoso, con enoxaparina 4.000 UI, in caso di chirurgia ortopedica maggiore e generale maggiore deve essere erogata in distribuzione per conto e può essere prescritta per un periodo di 4-5 settimane (3).

1. Documento di analisi sulla farmaceutica regionale Lazio, AIFA 2024

2. <https://www.aifa.gov.it/legge-648-96>

3. Integrazione determinazione n. G06036 del 05/05/2023 "Indicatori 2023 sulla spesa Farmaceutica Convenzionata e Distribuzione per Conto".