



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

Ai Direttori generali e
Commissari straordinari di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- ex Classificati

Oggetto: farmaco Blinatumomab (BLINCYTO® - Amgen) – trattamento di pazienti adulti e pediatrici con LLA - nuove indicazioni terapeutiche

Con la Determina AIFA n. PRES 1133 del 05.08.2026, pubblicata sulla GU n.185 del 11.08.2026, è stata autorizzata l'erogazione a carico del SSN del medicinale Blincyto, polvere per concentrato e soluzione per infusione – uso endovenoso, per le seguenti indicazioni terapeutiche:

- Blincyto è indicato in monoterapia come parte della terapia di consolidamento per il trattamento di pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B di nuova diagnosi, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia e negativa per la Malattia Minima Residua (MRD) dopo la fase di induzione;
- Blincyto è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, refrattaria o in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche;
- Blincyto è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento.

Il farmaco Blincyto, per le sopraelencate indicazioni, è soggetto a prescrizione tramite Registro Aifa on line da parte degli specialisti ematologi ed oncoematologi afferenti ai Centri di seguito riportati:

~~1. Az. Osp. San Giovanni-Addolorata~~

2. Az. Osp. San Camillo-Forlanini

3. Az. Osp. Sant'Andrea

4. Az. Osp. Univ. Pol. Tor Vergata

5. Policlinico Umberto I

6. Policlinico A. Gemelli

7. Policlinico Campus Biomedico

8. IRCCS IFO – Regina Elena

9. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

10. ASL Roma 1 – Polo Ospedaliero

11. ASL Roma 2 – Osp. Sant'Eugenio

12. ASL Frosinone – Osp. Spaziani

13. ASL Latina – Osp. Santa Maria Goretti

14. ASL Rieti – Osp. San Camillo de Lellis

15. ASL Viterbo – Osp. Santa Rosa (ex Belcolle)

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
posta certificata: politicadelfarmaco@pec.regione.lazio.it



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi - GR/39/21

La somministrazione del farmaco Blincyto, per le indicazioni sopra riportate, è a carico del Centro prescrittore.

L'utilizzo del farmaco Blincyto, per le indicazioni succitate, presso tutte le strutture private accreditate sopracitate, sarà subordinato all'acquisto da parte della ASL capofila RM2, ai sensi del DCA70. Per l'indicazione "*Blincyto è indicato in monoterapia come parte della terapia di consolidamento per il trattamento di pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B di nuova diagnosi, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia e negativa per la Malattia Minima Residua (MRD) dopo la fase di induzione*" è stato garantito l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi (Legge 30 dicembre 2024, n.207).

Tale accesso è subordinato all'espletamento di tutte le procedure relative alla corretta rendicontazione nel registro semplificato AIFA e alla capienza del fondo.

La Dirigente dell'Area
Marzia Mensurati

2026_09_02DB

Il Direttore
Andrea Urbani